

IMIDASECT ANTS

Gel-Köderschalen gegen Ameisen

Verwendung durch breite Öffentlichkeit

Formulierung: Gel zur direkten Anwendung

Wirkstoff: Imidacloprid

Chemische Familie: Nitroguanidine (Neonicotinoide)

Konzentration: 0,01 g/kg, 0,01% w/w

Zulassungsnummer: DE-0009275-18

UFI: PEDV-G68N-F904-U6NY

Zum Gebrauch in Innenräumen und Außenbereichen von Gebäuden.

Zielinsekten:

Pharaoameisen (*Monomorium pharaonis*), Argentinische Ameisen (*Linepithema humile*) und Schwarze Wegameise (*Lasius niger*). Adulte.

Wirkungsweise:

Der Wirkstoff Imidacloprid wirkt durch die Bindung an die Neuronen der Insekten. Diese Bindung verursacht eine Übertragungsstörung der Nervenimpulse, die für die Zielinsekten tödlich ist. Die Ameisen werden durch die Inhaltstoffe des Köders angelockt. Die Tiere verteilen das Gel durch ihre Bewegung und vergiften ihre Artgenossen durch den Kontakt und die Aufnahme des Gels.

Gebrauchsanweisung:

Beachten Sie die Gebrauchsanweisung. Entfernen Sie vor der Behandlung alle natürlichen Nahrungsquellen für Ameisen (z.B. Abfall, Essensreste ...) aus dem betroffenen Bereich, um die Aufnahme des Gels zu fördern. Wenn die Ameisen im Innenbereich sind, stellen Sie die Köderschalen in der Nähe von Ameisenstraßen, Eintrittsstellen und Nestern auf. Wenn Ameisen im Außenbereich sind, stellen Sie die Köderschalen direkt auf den Ameisenstraßen oder in den Nestern auf.

Nur in Bereichen anwenden, die nicht überschwemmt oder nass werden, d. h. vor Regen, Hochwasser und Reinigungswasser geschützt sind. Köderschalen einmal pro Woche kontrollieren. Überprüfen Sie während der Inspektionen die behandelte Fläche und ersetzen Sie bei Bedarf die Köderschale. Das Produkt nicht auf absorbierenden Oberflächen verwenden. Produkt so ausbringen, dass es weder direktem Sonnenlicht noch Hitzequellen (z.B. Heizstrahler) ausgesetzt ist. Vermeiden Sie eine kontinuierliche Anwendung des Produkts. Eine spürbare Reduzierung der Ameisen ist innerhalb von 4 Wochen zu erwarten. Die Wirksamkeit ist nur gegen erwachsene Arbeiterinnen nachgewiesen, nicht gegen alle Ameisen im Nest. Wenn der Befall trotz Befolgen der Anweisungen des Etiketts weiterhin besteht, wenden Sie sich an einen professionellen Schädlingsbekämpfer. Informieren Sie den Zulassungsinhaber, falls die Behandlung nicht erfolgreich ist. Köderschalen entfernen, wenn der Befall aufhört.

Verwenden Sie die Produkte in den empfohlenen Dosierungen und Intervallen. Verwenden Sie Neonicotinoide nicht zur Folgebehandlung, wenn Resistenzen die Wirksamkeit verringern. Überwachen Sie problematische Schädlingspopulationen, um erste Veränderungen der Empfindlichkeit festzustellen. Um das Auftreten von Resistenzen gegen einen Wirkstoff zu vermeiden, sollten Produkte mit unterschiedlichen Wirkungsweisen abwechselnd eingesetzt und die häufige wiederholte Anwendung desselben Wirkstoffs vermieden werden. Die Verwendung von Biozidprodukten kann mit anderen Hygienemaßnahmen kombiniert werden. Die Produkte sollten immer in Übereinstimmung mit den Empfehlungen auf dem Etikett verwendet werden.

IMIDASECT ANTS wird zur Anwendung empfohlen in: **Wohnräumen** (einschließlich Küchen), **Orten der**

Lebensmittelverarbeitung: Verarbeitung: Lebensmittelhersteller, Küchen, Schlachthöfe usw. Lagerung: Lebensmitteleinzelhändler, Warenhäuser, Rohstofflager, Silos (ausgenommen Getreidelager) usw. Zubereitung von Nahrungsmitteln: Restaurants, Großküchen, usw.; **Öffentlichen Gebäuden:** Dauerhaft genutzte Bereiche wie Krankenstationen, Hotels, öffentliche Bäder, kommunale Gebäude, Kirchen, Hallen, Gemeindezentren, Kinos etc.

Anwendung:

Max. Anwendungs-verhältnis	Bait tray size			
	0,75 g	1,0 g	1,2 g	1,4 g
Innenraum (0,2 g/m ²)	1 Köderschale/ 3,8 m ²	1 Köderschale/ 5 m ²	1 Köderschale/ 6 m ²	1 Köderschale/ 7 m ²
Außenbereich (0,2 g/m ²)	1 Köderschale/ 3,8 m ²	1 Köderschale/ 5 m ²	1 Köderschale/ 6 m ²	1 Köderschale/ 7 m ²

*Tabelle der Anwendungsmenge in Abhängigkeit der Köderschalengröße.

Das Produkt kann kontinuierlich für 2 Monate verwendet werden, ohne geöffnete Köderschalen zu ersetzen. Maximal 12 Anwendungen pro Jahr.

Schritt 1: Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie die Köderdosen.

Schritt 2: Um die Köderdosen einsatzbereit zu machen, trennen Sie bitte die grünen eingestanzten Laschen ab. Diese Laschen dienen dem Schutz der Köder und müssen entfernt werden, damit sie wirksam sind.

Schritt 3: Stellen Sie die Köderdosen an den ausgewählten Standort. Achten Sie darauf, dass sie gut zugänglich sind und sich in der Nähe der potenziellen Quellen des Ameisenbefalls befinden.

Risikomilderungsmaßnahmen:

Nicht auf oder in der Nähe von Nahrungsmitteln, Futtermitteln oder Getränken oder auf Oberflächen oder Gegenständen verwenden, die voraussichtlich in direkten Kontakt mit Nahrungsmitteln, Futtermitteln, Getränken und Nutztieren/Haustieren kommen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Entsorgung:

Inhalt / Behälter gemäß den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. Unbenutztes Produkt nicht auf den Erdboden, in Wasserläufe, in Rohrleitungen (Waschbecken, Toiletten...) oder in die Kanalisation gelangen lassen. Entsorgen Sie das unbenutzte Produkt, seine Verpackung und alle anderen Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften. Die Köderschale darf vor der Entsorgung nicht gereinigt werden.

Lagerung:

Nicht in der Nähe von Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln lagern. Das Produkt muss vor Licht geschützt gelagert werden. Die Haltbarkeit beträgt 48 Monate. Von Kindern und Nichtzielorganismen/Haustieren fernhalten.

Erste Hilfe:

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Haut mit Wasser waschen. Bei Auftreten von Symptomen GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Bei Auftreten von Symptomen mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene

Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI
VERSCHLUCKEN: Bei Auftreten von Symptomen
GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. BEI
EINATMEN: Nicht zutreffend.

WICHTIG:

Insektizide mit Vorsicht anwenden. Vor der Anwendung das Etikett lesen.

Beachten Sie die Anwendung, Dosierungen, Bedingungen und Vorsichtsmaßnahmen auf der Verpackung, die aufgrund der Produkteigenschaften festgelegt wurden und die Anwendungen, für die es empfohlen wird.

Die Behandlung sollte entsprechend der guten Praxis, unter Berücksichtigung Ihrer Eigenverantwortung für alle spezifischen Faktoren, die in Betracht kommen und außerhalb unserer Kontrolle sind (verwendetes Material, Anwendungsbedingungen, Produktmischungen, usw.) durchgeführt werden.

Der Hersteller gewährleistet die Qualität seiner Produkte, die in der Originalverpackung gekauft werden.

Klassifizierung



H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.
P501: Inhalt/Behälter gemäß der nationalen Gesetzgebung der Entsorgung zuführen.

Das Produkt enthält einen Bitterstoff.

Dieses Biozidprodukt enthält Imidacloprid, das für Bienen gefährlich ist.

Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Anweisungen beachten.

Zulassungsinhaber:

Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina Nº3 Planta 12,
30006 Murcia
Spanien

Vertrieb durch:

Größe: 0,75 g, 1,0 g, 1,2 g and 1,4 g

Chargennummer:

Herstellungsdatum:

Verfallsdatum:

Haltbarkeit: (4 Jahre ab dem Herstellungsdatum)