

GEBRAUCHSANWEISUNG

Schabengel

Novokill

INHALT DES PAKETES:

Novokill Gel zur Bekämpfung
von Kakerlaken & Schaben

 **kæferling æ**



INHALTSSTOFFE

Imidacloprid 2.15 % Gel

VORBEREITUNG

1. Auspacken

Öffnen Sie vorsichtig die Verpackung und entnehmen Sie die Gelspritze.

2. Schutzkappe entfernen

Entfernen Sie die Schutzkappe von der Spritze.

STANDORTAUSWAHL


Wählen Sie Bereiche aus, in denen Sie häufig Kakerlaken beobachtet haben.

Mögliche Beispiele sind:

- In der Nähe von Küchengeräten und Schränken
- Unter Spülen und in der Nähe von Wasserrohren
- In Ecken und dunklen Verstecken
- In Speisekammern und Lagerräumen


ANWENDUNG

Tragen Sie kleine Tropfen Gel an den ausgewählten Stellen auf. Achten Sie darauf, das Gel an schwer zugänglichen Stellen zu platzieren, fern von Kindern und Haustieren.



VERTEILUNG

Verteilen Sie etwa 1 bis 2 Tropfen pro m² bei einem Befall von Deutschen Schaben. Bei Orientalischen Schaben sollten Sie etwa 2 bis 3 Tropfen pro m² verwenden.



ÜBERWACHUNG UND WARTUNG

- **Regelmäßige Kontrolle:** Überprüfen Sie die behandelten Bereiche regelmäßig auf Kakerlaken.
- **Nachfüllen:** Ersetzen Sie das Gel, sobald es verbraucht ist oder seine Wirksamkeit verliert, dies passiert in der Regel nach 2 Monaten.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

Vermeiden Sie den Kontakt des Gels mit Haut und anderen empfindlichen Oberflächen.

Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.



ENTSORGUNG

Entsorgen Sie gebrauchte Verpackungen und leere Spritzen gemäß den lokalen Abfallentsorgungsbestimmungen.



kæferling
Online-Shop

B2B Pest
Control Shop

kæferling
Pro