

IMIDASECT ANTS

Vaschette esca in gel contro le formiche

Utilizzo da parte del pubblico**Formulazione:** Gel per applicazione diretta**Principio attivo:** Imidacloprid**Famiglia chimica:** Nitroguanidine (neonicotinoidi)**Concentrazione:** 0,01 g/kg, 0,01% p/p **Zulassungsnummer:** DE-0009275-18**UFI:** PEDV-G68N-F904-U6NY

Da utilizzare all'interno e all'esterno degli edifici.

Insetti bersaglio:Formiche faraone (*Monomorium pharaonis*), formiche argentine (*Linepithema humile*) e formiche nere (*Lasius niger*). Insetti adulti.**Modalità d'azione:**

Il principio attivo imidacloprid agisce legandosi ai neuroni degli insetti. Questo legame provoca un disturbo della trasmissione degli impulsi nervosi che è letale per gli insetti bersaglio. Le formiche sono attratte dagli ingredienti dell'esca. Gli animali distribuiscono il gel attraverso il loro movimento e avvelenano i loro conspecifici attraverso il contatto e l'ingestione del gel.

Istruzioni per l'uso:

Seguire le istruzioni per l'uso. Prima del trattamento, rimuovere tutte le fonti di cibo naturali per le formiche (ad esempio rifiuti, scarti di cibo...) dall'area interessata per favorire l'assorbimento del gel. Se le formiche si trovano in ambienti interni, posizionare le vaschette esca in prossimità dei percorsi delle formiche, dei punti di ingresso e dei nidi. Se le formiche sono all'aperto, posizionare le vaschette esca direttamente sui percorsi delle formiche o nei nidi. Applicare solo in aree non allagate o bagnate, cioè al riparo dalla pioggia, dalle acque alluvionali e dalle acque di lavaggio. Ispezionare le vaschette porta-esca una volta alla settimana. Durante le ispezioni, controllare l'area trattata e, se necessario, sostituire la vaschetta. Non utilizzare il prodotto su superfici assorbenti. Applicare il prodotto in modo che non sia esposto alla luce diretta del sole o a fonti di calore (ad esempio, riscaldatori radianti). Evitare l'applicazione continua del prodotto. Si prevede una riduzione sensibile delle formiche entro 4 settimane. L'efficacia è stata dimostrata solo contro le operaie adulte, non contro tutte le formiche presenti nel nido. Se l'infestazione persiste nonostante le istruzioni dell'etichetta, contattare un professionista della disinfestazione. Informare il titolare della licenza se il trattamento non ha successo. Rimuovere le vaschette esca quando l'infestazione cessa. Utilizzare i prodotti ai dosaggi e agli intervalli raccomandati. Non utilizzare i neonicotinoidi per i trattamenti successivi se la resistenza riduce l'efficacia. Monitorare le popolazioni di insetti problematici per individuare i cambiamenti iniziali nella suscettibilità. Per evitare l'insorgenza di resistenza a un principio attivo, alternare prodotti con modalità d'azione diverse ed evitare l'uso frequente e ripetuto dello stesso principio attivo. L'uso di biocidi può essere combinato con altre misure igieniche. I prodotti devono sempre essere utilizzati secondo le raccomandazioni riportate sull'etichetta.

IMIDASECT ANTS è consigliato per l'uso in: **Ambienti di vita**(comprese le cucine), **luoghi di lavorazione degli alimenti:**

Lavorazione: produttori di alimenti, cucine, macelli, ecc.

Stoccaggio: rivenditori di prodotti alimentari, grandi

magazzini, negozi di materie prime, silos (eccetto i

magazzini di cereali), ecc. Preparazione degli alimenti:

Ristoranti, cucine commerciali, ecc.; **Edifici pubblici:** aree

utilizzate in modo permanente come reparti ospedalieri, alberghi, bagni pubblici, edifici comunali, chiese, sale, centri comunitari, cinema, ecc.

Applicazione:

Max. Rapporto di applicazione	Dimensione della vaschetta per esche			
	0,75 g	1,0 g	1,2 g	1,4 g
Interno (0,2 g/m ²)	1 vassoio per esche/3,8 m ²	1 vassoio per esche/5 m ²	1 vassoio per esche/6 m ²	1 vassoio per esche/7 m ²
Area esterna (0,2 g/m ²)	1 vassoio per esche/3,8 m ²	1 vassoio per esche/5 m ²	1 vassoio per esche/6 m ²	1 vassoio per esche/7 m ²

*Tabella delle quantità di applicazione in base alle dimensioni della vaschetta per esche.

Il prodotto può essere utilizzato ininterrottamente per 2 mesi senza sostituire le vaschette di esca aperte. Massimo 12 applicazioni all'anno.

Fase 1: Aprire la confezione e rimuovere le scatole di esche.

Fase 2: per rendere le scatole di esche pronte all'uso, separare le linguette verdi timbrate. Queste linguette servono a proteggere le esche e devono essere rimosse perché siano efficaci.

Fase 3: collocare le scatole delle esche nel luogo prescelto. Assicuratevi che siano facilmente accessibili e vicine alle potenziali fonti di infestazione delle formiche.

Misure di riduzione del rischio:

Non utilizzare su o in prossimità di alimenti, mangimi o bevande o su superfici o oggetti che possono entrare in contatto diretto con alimenti, mangimi, bevande e animali domestici. Evitare il rilascio nell'ambiente.

Smaltimento:

Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alle normative nazionali. Non lasciare che il prodotto non utilizzato raggiunga il suolo, i corsi d'acqua, le tubature (lavandini, gabinetti...) o gli scarichi. Smaltire il prodotto non utilizzato, l'imballaggio e tutti gli altri rifiuti in conformità alle normative locali. Non pulire la vaschetta porta-esca prima dello smaltimento.

Conservazione:

Non conservare in prossimità di alimenti, bevande e mangimi. Il prodotto deve essere conservato al riparo dalla luce. La durata di conservazione è di 48 mesi. Tenere lontano dai bambini e dagli organismi non bersaglio/animali domestici.

Primo soccorso:

Se è necessario un parere medico, tenere a portata di mano l'imballaggio o l'etichetta. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare la pelle con acqua. In caso di sintomi, chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare con acqua in caso di sintomi. Rimuovere le lenti a contatto se possibile. Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INGESTIONE: Chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico se si manifestano i sintomi. IN CASO DI INALAZIONE: Non applicabile.

IMPORTANTE:**Usare gli insetticidi con cautela. Leggere l'etichetta prima dell'uso.**

BEIBLATT VOM HERSTELLER: Sharda Cropchem Ltd

Osservare l'uso, i dosaggi, le condizioni e le precauzioni riportate sulla confezione, stabilite in base alle caratteristiche del prodotto e alle applicazioni per cui è raccomandato.

Il trattamento deve essere eseguito secondo le buone pratiche, tenendo conto della propria responsabilità per tutti i fattori specifici che entrano in gioco e che sfuggono al nostro controllo (materiale utilizzato, condizioni d'uso, miscele di prodotti, ecc.)

Il produttore garantisce la qualità dei suoi prodotti, acquistati nella loro confezione originale.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Sharda Cropchem España S.L.
Edificio Atalayas Business Center,
Carril Condomina N°3 Planta 12,
30006 Murcia
Spagna

Distribuito da:

Agrezor International GmbH
Kölnstr. 58
50354 Hürth
Allemagne

Dimensioni: 0,75 g, 1,0 g, 1,2 g e 1,4 g

Numero di lotto:

Data di produzione:

Data di scadenza:

Durata di conservazione: (4 anni dalla data di produzione)

Classificazione



H411: tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P273: Evitare il rilascio nell'ambiente.

P391: assorbire le fuoriuscite.

P501: Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla legislazione nazionale.

Il prodotto contiene un agente amaricante.

Questo biocida contiene imidacloprid, pericoloso per le api.

Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente, seguire le istruzioni.